

Rodzaj i typ sadzonki	Przeznaczenie do wykorzystania w uprawie	Orientacyjny termin sadzenia	Orientacyjny czas od momentu posadzenia do pierwszego owocowania na poziomie 75 % potencjału plonotwórczego wybranej odmiany	Przykładowe zalety	Przykładowe wady
Świeża, zielona, kopana	uprawa klasyczna, prowadzona w systemie jedno- lub dwurzędowe „na płasko” w tradycyjny sposób.	wrzesień, październik	Ok. 21 miesięcy	Sadzonki są tanie i powszechnie dostępne.	Zbyt długi okres oczekiwania od momentu posadzenia do owocowania.
Frigo A i A+	uprawa klasyczna „na płasko”, na podwyższonych zagonach, na zagonach w podłożach ogrodnich lub w systemach hydroponicznych	Kwiecień, maj, nie później niż do połowy czerwca lub w uprawie sterowanej <i>frigo A +</i> w lipcu na zbiór jesienno-wiosenny	Ok. 60-80 dni, jeśli zostawimy pierwsze pojawiające się kwiaty.	Powszechnie dostępne szeroki wybór odmian i klas sadzonek, obecnie podstawowy rodzaj materiału; ceny są umiarkowane i akceptowane przez plantatorów	W czasie przygotowania do sadzenia i sadzenia roślin należy zwracać uwagę na długość systemu korzeniowego. Odcięty system korzeniowy jest podatny na infekcje. Konieczna jest wzmożona uwaga w pierwszych tygodniach po posadzeniu.
Frigo A- i B	uprawa klasyczna „na płasko” na podwyższonych zagonach	czerwiec, lipiec, nie później niż do połowy lipca	ok. 10-12 miesięcy, w roku sadzenia konieczne jest usuwanie pierwszych kwiatów	Atrakcyjne ceny sadzonek, powszechna ich dostępność. Niezwykle przydatne do zakładania plantacji owocującej w kolejnym roku.	Wady są podobne jak sadzonek frigo A i A+, niekiedy sadzonki frigo A- i B są zbyt późno sadzone i tym przypadku bardzo słabo sobie radzą w zimie, dlatego nie można opóźnić terminu sadzenia tego typu materiału. W roku sadzenia należy usuwać wszystkie pojawiające się kwiaty.
Wielokoronowe (WB)	uprawa na podwyższonych zagonach okrytych folią, uprawa w podłożach ogrodnich	kwiecień, maj lub w uprawie sterowanej na zbiór letnio-jesienno dla odmian dnia krótkiego	ok. 60 dni od posadzenia	Wyższy potencjał plonotwórczy niż sadzonek frigo, możliwość zbierania pierwszych owoców po ok. 60 dniach. Bardzo silnie rozwinięte rośliny.	Ich dostępność nie jest tak szeroka jak sadzonek frigo, czasami są produkowane na specjalne zamówienia, cena wyższa niż sadzonek frigo.
Doniczkowa czterotygodniowa plug plants	uprawa klasyczna jedno- lub dwurzędowa, na podwyższonych zagonach w glebie lub glebowa uprawa w tunelu	od połowy lipca do połowy sierpnia	ok. 11 miesięcy	Materiał z bryłą korzeniową i kilkoma liśćmi, nie ma problemu z przyjęciem się sadzonek. Można sadzić w sierpniu i otrzymywać przyzwoity plon w następnym roku.	Należy zwrócić uwagę, aby nie przesuszyć bryły korzeniowej oraz nie uszkodzić systemu korzeniowego i liści podczas sadzenia.
Mini tray plants	uprawa pod osłonami w glebie lub podłożach ogrodnich, na podwyższonych zagonach	od końca lipca do połowy sierpnia lub do nasadzeń wiosennych	zbiór pierwszych owoców już po 60 dniach, w zależności od wybranej odmiany	Większa bryła korzeniowa niż w sadzonkach plug plants.	Wyższa cena sadzonki, dostępność ograniczona – sadzonki często produkowane są tylko na zamówienie
Tray plants	Uprawa pod osłonami w podłożach ogrodnich albo systemach aeroponicznych lub hydroponicznych; szczególnie rekomendowane do uprawy w ogrzewanych tunelach lub szklarniach, z możliwością sterowania terminem zbioru owoców	Sadzenie jest możliwe przez cały rok, pod osłonami ogrzewanymi można sadzić już od przełomu stycznia i lutego	ok. 60 dni od posadzenia, w zależności od wybranej odmiany	Bardzo szybko wchodzą w okres owocowania, przeznaczone do najbardziej zaawansowanych systemów uprawowych.	Najwyższa cena jednostkowa, potrzebne są specjalne systemy uprawowe oraz specjalistyczna wiedza. Ze względu na cenę i wymagania nie są polecane do klasycznej uprawy w gruncie.

Jagodnik numer 1 (47) styczeń 2019, z artykułu „Typy i rodzaje sadzonek truskawki cz II – sadzonki doniczkowane”, autor: Albert Zwierzyński, Agro Wsparcie, strona 30